

Granulomatose non nécrosante chez les sujets âgés

Fraj A, Arfa S, Chelli J, Ben Azaiez M, Laarbi F, Berriche O, Sfar MH

Service de médecine interne et d'endocrinologie, CHU Taher Sfar, Mahdia

Introduction :

Les granulomatoses représentent un groupe hétérogène de pathologies. L'exploration des granulomatoses est nécessaire et souvent confiée aux internistes en collaboration avec les autres spécialistes.

Notre objectif était de décrire les caractéristiques cliniques et le profil étiologique des granulomatoses non nécrosantes dans un service multidisciplinaire.

Patients et méthodes :

Il s'agit d'une étude rétrospective, menée dans un service de médecine interne entre 2010 et 2018 incluant les patients suivis pour une granulomatose. Le diagnostic de granulomatose était retenu sur un examen anatomopathologique.

Résultats :

Parmi 20 patients suivis pour granulomatose non nécrosante, 8 étaient âgés de plus que de 65 ans. Il s'agissait de 5 femmes et 3 hommes d'âge moyen était de 69 ans.

Les signes inauguraux étaient dominés par l'altération de l'état général (tableau 1).

Sur le plan clinique, un syndrome tumoral était identifié dans 5 cas (62%) : des adénopathies dans 5 cas, une splénomégalie dans 3 cas une hépatomégalie dans un cas. Des adénopathies profondes étaient trouvées dans 3 cas (37%).

Tableau 1: les signes inauguraux

Altération de l'état général	87%
Asthénie	75%
Fièvre	50%
Syndrome sec	37%
Signes respiratoires	25%

Les anomalies biologiques sont présentés dans la figure 1. Le siège de la granulomatose est illustré dans la figure 2. Les étiologies étaient dominées par la tuberculose (75%). La sarcoïdose représentait 25% des étiologies.




Figure 1: les manifestations biologiques




Figure 2: le siège de granulomatose

Conclusion :

Notre étude était riche par le polymorphisme des aspects cliniques et biologiques chez les sujets âgés.

La tuberculose reste l'étiologie la plus fréquente de granulomatose chez les sujets âgés Il fait toujours la suspecter surtout en présence d'une altération de l'état général.